

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ВИПРОСАЛ В®

наименование лекарственного препарата

Регистрационный номер: П N015169/01 от 26.05.2009

Торговое наименование: ВИПРОСАЛ В®

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Камфора+Салициловая кислота+Скипидар живичный+Яд гадюки

Состав

1 г мази содержит:

действующие вещества: яд гадюки обыкновенной сухой – 0,05 МЕД (мышинных единиц действия), камфора рацемическая – 30 мг, скипидар живичный – 30 мг и салициловая кислота – 10 мг;

вспомогательные вещества: вазелин, цетостеариловый спирт, парафин твердый, натрия цетилстеарилсульфат, глицерол, натрия хлорид и вода очищенная до 1 г.

Описание

Мазь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета, с запахом камфоры и скипидара.

Фармакотерапевтическая группа

местнораздражающее средство природного происхождения.

Код АТХ: M02AX10

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Випросал В® болеутоляющая мазь с ядом гадюки. Фармакологическое действие обусловлено входящими в состав препарата компонентами: яд гадюки, камфора, скипидар, салициловая кислота. Препарат вызывает раздражение чувствительных рецепторов кожи и подкожной клетчатки, расширяет сосуды, улучшает трофику тканей. Обладает местнораздражающим и болеутоляющим действием.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания к применению

Невралгии, артралгии, миозиты.

В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам мази, повреждения кожных покровов, кожные заболевания (в том числе аллергического и бактериального генеза), лихорадочные состояния, туберкулез легких, нарушения мозгового и коронарного кровообращения, склонность к возникновению ангиоспазмов, тяжелые нарушения функции почек и печени, общее истощение.

Беременность и период грудного вскармливания.

Детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение мази противопоказано.

Способ применения и дозы

Наружно. Взрослые и дети старше 12 лет.

При первом применении для того, чтобы открыть тубу, следует проткнуть мембрану на горловине тубы конусообразным приспособлением в навинчивающемся бушоне.

На болезненный участок наносят маленькими порциями 5-10 г (1-2 чайные ложки) мази и

втирают ее в кожу в зависимости от интенсивности боли 1-2 раза в сутки до исчезновения болевого синдрома.

Продолжительность курса лечения зависит от характера и степени тяжести заболевания.

При сохранении симптомов болезни после 14-дневного лечения проконсультируйтесь с врачом.

Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочное действие

При применении препарата возможны побочные эффекты в виде зуда, отека, крапивницы.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При случайном проглатывании препарата возможно расстройство желудочно-кишечного тракта. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Нельзя наносить мазь на поврежденную кожу. Во избежание сильного раздражения, следует избегать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки.

Мазь содержит цетостеариловый спирт, который может вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

Перед первым применением препарата рекомендуется нанести небольшое количество мази на кожу для определения чувствительности к компонентам препарата.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Мазь для наружного применения.

По 30 г, 50 г и 75 г (для производителя АО Таллиннский фармацевтический завод) или по 30 г и 50 г (для производителя АО «Гриндекс») в тубе алюминиевой с внутренней поверхностью, покрытой лаком, с защитной алюминиевой мембраной на горловине и конусообразным приспособлением для прокола мембраны в навинчивающемся бушоне из полиэтилена или полипропилена.

Тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного.

На пачке может быть нанесен стикер для контроля первого вскрытия.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C. Не хранить в холодильнике и морозильной камере.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта

Владелец регистрационного удостоверения

АО «Гриндекс».

Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV – 1057, Латвия

Телефон: +371 67083205

Факс: +371 67083505

Электронная почта: grindeks@grindeks.lv

Производитель(и)

АО Таллиннский фармацевтический завод.

Тонди 33, 11316 Таллинн, Эстония

Телефон: +372 612 0201

Электронная почта: farma@tft.ee

АО «Гриндекс».

Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия

Телефон: +371 67083205

Факс: +371 67083505

Электронная почта: grindeks@grindeks.lv

Организация, принимающая претензии

ООО «Гриндекс Рус».

Россия, 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 74, корп. 3, 5 этаж.

Телефон: +7 (495) 7716505

Факс: +7 (499) 6103963

Электронная почта: office@grindeks.ru